

Сажетак карактеристика биоцидног производа

Назив(и) биоцидног производа: ZZ ARIA APERTA

Врста(е) биоцидног производа: Инсектициди, акарициди и производи за контролу
других зглавкара (PT 18)

Садржај

1.1. Трговачки назив(и) биоцидног производа	1
1.2.а Подносилац захтева за доношење решења о признавању одобрења	1
1.2.б Носилац одобрења донетог у складу са прописом ЕУ	1
1.3. Произвођач(и) биоцидног производа	1
1.4. Произвођач(и) активне супстанце	1
2. Састав и врста формулација биоцидног производа	2
2.1. Подаци о квалитативном и квантитативном саставу биоцидног производа	2
2.2. Врста формулације биоцидног производа	2
3. Обавештења о опасности и мерама предострожности	3
4. Одобрени начин(и) коришћења	3
4.1. Опис одобреног начина коришћења	3
4.1.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења	4
4.1.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења	4
4.1.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине	4
4.1.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже	5
4.1.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења	5
4.2. Опис одобреног начина коришћења	5
4.2.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења	6
4.2.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења	6
4.2.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине	6
4.2.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже	6
4.2.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења	6
5. Општа упутства за употребу	7
5.1. Упутства за употребу	7
5.2. Мере за смањење ризика	7
5.3. Подаци о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине	7
5.4. Упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже	8
5.5. Услови складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења	8
6. Друге информације о биоцидном производу, по потреби	8

1.1. Трговачки назив(и) биоцидног производа

Трговачки назив(и)	ZZ Aria Aperta
--------------------	----------------

1.2.а Подносилац захтева за доношење решења о признавању одобрења

Назив и адреса подносиоца захтева за доношење решења о признавању одобрења	Назив	Top Deisa d.o.o.
	Адреса	Краља Петра 58/6, 11000 Београд, Србија
Број решења о признавању одобрења	000146087 2024 14850 003 014 501 043	
Датум доношења решења о признавању одобрења	30. септембар 2024. године	
Датум истека рока важења решења о признавању одобрења	29. јул 2031. године	

1.2.б Носилац одобрења донетог у складу са прописом ЕУ

Назив и адреса носиоца одобрења	Назив	Deisa Ebano s.p.a.
	Адреса	Via Collamarini 27, 40138 Bologna, Италија
Број одобрења	IT/2023/00885/BVP	
Датум доношења одобрења	14. јул 2023. године	
Датум истека рока важења одобрења	29. јул 2031. године	

1.3. Произвођач(и) биоцидног производа

Назив произвођача	Deisa Ebano s.p.a.
Адреса произвођача	Via Collamarini 27, 40138 Bologna, Италија
Локација производног погона	Via Collamarini 27, 40138 Bologna, Италија

1.4. Произвођач(и) активне супстанце

Активна супстанца	трансфлутрин
Назив произвођача	Bayer SAS Environmental Science
Адреса произвођача	16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, F-69266 Lyon Cedex 09, Француска
Локација производног погона	Bayer Vapi Private Limited (раније Bilag Industries Pvt. Ltd.), Plot No. 306/3 Phase II, GIDC, Vapi, 396195 Gujarat, Индија
Активна супстанца	5-{[2-(2-бутоксиетокси)етокси]метил}-6-пропил-1,3-бензодиоксол (пиперонил бутоксид)

Назив произвођача	ENDURA S.p.A.
Адреса произвођача	Viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Италија
Локација производног погона	ENDURA S.p.A, Via Baiona 107-111, 48123 Ravenna, Италија

Активна супстанца	(RS)- α -цијано-4-флуор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (цифлутрин)
Назив произвођача	Bayer SAS Environmental Science
Адреса произвођача	16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, F-69266 Lyon Cedex 09, Француска
Локација производног погона	Bayer Vapi Private Limited (раније Bilag Industries Pvt. Ltd.), Plot No. 306/3 Phase II, GIDC, Vapi, 396195 Gujarat, Индија

2. Састав и врста формулација биоцидног производа

2.1. Подаци о квалитативном и квантитативном саставу биоцидног производа

Назив	Назив према IUPAC-у	Функција	CAS број	ЕС број	Садржај (%)
трансфлутрин		Активна супстанца	118712-89-3	405-060-5	0,114
цифлутрин	(RS)- α -цијано-4-флуор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	Активна супстанца	68359-37-5	269-855-7	0,026
пиперонил бутоксид	5-{[2-(2-бутоксиетокси)етокси]метил}-6-пропил-1,3-бензодиоксол	Активна супстанца	51-03-6	200-076-7	0,213

2.2. Врста формулације биоцидног производа

АЕ – Аеросолни распршивач

3. Обавештења о опасности и мерама предострожности

Обавештења о опасности	Веома запаљив аеросол. Посуда под притиском: може се распрснути, ако се загрева. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
Обавештења о мерама предострожности	Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Прочитати пажљиво и пратити сва упутства. Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење. Не прскати на отворен пламен или други извор паљења. Не пробијати, нити палити, чак ни након употребе. Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину. Сакупити просути садржај. Складиштити на сувом месту. Заштитити од сунчеве светлости. Не излагати температурама вишим од 50°C/122°F. Одлагање садржаја /амбалаже у складу са националним прописима.

4. Одобрени начин(и) коришћења

4.1. Опис одобреног начина коришћења

Начин коришћења 1 - У затвореном простору директним прскањем на гнезда оса

Врста биоцидног производа	РТ 18 - Инсектициди, акарициди и производи за контролу других зглавкара
Где је примењиво, тачан опис одобреног начина коришћења	Истребљење гнезда оса у затвореном простору.
Циљни штетни организми (укључујући стадијуме развоја)	Научно име: <i>Vespula germanica</i> Уобичајено име: немачка оса Стадијум развоја: одрасли Научно име: <i>Vespula germanica</i> Уобичајено име: немачка оса Стадијум развоја: нимфе Научно име: <i>Polistes</i> sp. Уобичајено име: папирна оса Стадијум развоја: одрасли Научно име: <i>Polistes</i> sp.

	Уобичајено име: папирна оса Стадијум развоја: ларве
Област(и) коришћења	У затвореном Гнезда оса
Начин(и) примене	Метода: Директно прскање на гнезда оса. Детаљан опис: Производ се примењује на приступачна гнезда оса, која нису скривена у шупљинама. Амбалажа производа је опремљена посебним млазним вентилом са цевчицом која омогућава безбедну употребу на растојању од око 4 m од гнезда. На овај начин се може доћи до гнезда оса смештених на тавану, у угловима плафона, испод кровова и шиндри. Добро протресите пре употребе. Прскајте 1 s са растојања од 4 m. Обично је то довољно да се гнездо у потпуности прекрије пеном и постигне брзо уништавање оса. За сузбијање гнезда папирних оса, прскајте 1 s са растојања од 2-3 m.
Доза(е) и учесталост примене	Доза: Нанесите директно на гнездо оса у трајању од 1 s (15 g). Разблажење (%): Спреман за употребу. Број и временски интервал примене: Нанесите директно на гнездо оса у трајању од 1 s (15 g/s). Користите до два пута годишње.
Категорија(е) корисника	Шира јавност (становништво)
Величина(е) и материјал амбалаже	Распршивач Притисак распршивача 5-6 bar на 20°C запремине од 300-1000 ml. Посуда од белог лима. Унутрашњи зидови посуде обложени су слојем епокси фенолне смоле. Пластични актуатор од полипропилена.

4.1.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења

Не наносите производ на електричну опрему. Амбалажа производа је опремљена посебним млазним вентилом за третирање гнезда оса.

4.1.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења

Током примене прекрити под непропусним материјалом и одложити га након третмана.

4.1.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту

животне средине

Не очекују се директни или индиректни ефекти ако се производ користи у складу са упутством.

4.1.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже

Не бацајте празну посуду у животну средину.

4.1.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења

Препоручује се складиштење на собној температури.

4.2. Опис одобреног начина коришћења

Начин коришћења 2 - У пукотинама и шупљинама за сузбијање гмижућих инсеката

Врста биоцидног производа	РТ 18 - Инсектициди, акарициди и производи за контролу других зглавкара
Где је примењиво, тачан опис одобреног начина коришћења	Сузбијање гмижућих инсеката у пукотинама и шупљинама.
Циљни штетни организми (укључујући стадијуме развоја)	Научно име: <i>Blatta orientalis</i> Уобичајено име: црна бубашваба Стадијум развоја: одрасли Научно име: <i>Blattella germanica</i> Уобичајено име: смеђа бубашваба (бубаруса) Стадијум развоја: одрасли Научно име: <i>Lasius niger</i> Уобичајено име: црни мрав Стадијум развоја: одрасли
Област(и) коришћења	У затвореном На местима где инсекти могу наћи уточиште, у пукотинама и шупљинама. Кућне просторије. Приватни станови.
Начин(и) примене	Метода: Прскање Детаљан опис: Примењује се на местима где инсекти могу наћи уточиште, у пукотинама и шупљинама. Амбалажа производа је опремљена посебним млазним вентилом са цевчицом која омогућава безбедну употребу унутар пукотина и шупљина. Млазни вентил се може

	користити и на уобичајени начин директним прскањем пукотина и шупљина. Кућне просторије. Приватни станови.
Доза(е) и учесталост примене	Доза: Нанесите равномерно у трајању од 4 s (6 g) по m ² . Разблажење (%): Спреман за употребу. Број и временски интервал примене: Третман је ефикасан до 4 недеље. Користите до 11 пута годишње.
Категорија(е) корисника	Шира јавност (становништво)
Величина(е) и материјал амбалаже	Распршивач Притисак распршивача 5-6 bar на 20°C запремине од 300-1000 ml. Посуда од белог лима. Унутрашњи зидови посуде обложени су слојем епокси фенолне смоле. Пластични актуатор од полипропилена.

4.2.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења

Нанесите у затвореном простору, нпр. испод кухињског намештаја, испод фрижидера, испод судопере, испод шпорета или бојлера.
Не наносите производ у близини електричних инсталација.
Нанесите на чисте површине да бисте постигли боље резултате.

4.2.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења

Користите само на местима недоступним деци и животињама, посебно мачкама.
Држати децу и кућне љубимце, посебно мачке даље од простора који се третира.
Пре примене уклоните или прекријте тераријуме, акваријуме и кавезе за животиње.
Током прскања искључите филтер за ваздух у акваријуму.

4.2.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине

Не очекују се директни или индиректни ефекти ако се производ користи у складу са упутством.

4.2.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже

Видети одељак Општа упутства за употребу.

4.2.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења

Препоручује се складиштење на собној температури.

5. Општа упутства за употребу

5.1. Упутства за употребу

Производ је спреман за употребу и садржи трансфлутрин, цифлутрин и пиперонил бутоксид. У облику је аеросола који се прска на површине кроз распршивач са цевчицом који је саставни део амбалаже.

Придржавајте се упутства за употребу. Добро протресите посуду пре употребе.

Производ увек треба да користите у складу са препорукама наведеним на етикети.

Ако је могуће, комбиновати примену производа са мерама које нису хемијске.

Производ садржи пиперонил бутоксид и трансфлутрин који су опасни за пчеле.

Начела стратегија за управљање појавом резистенције:

- Ако је могуће, препоручити примену производа у комбинацији са мерама које нису хемијске.
- Примењивати производ на најосетљивији развојни стадијум штеточина.
- Када је потребан дужи период контроле, третмане треба смењивати са производима са различитим начином деловања.
- Пратити нивое ефикасности, а случајеве смањене ефикасности треба истражити због могућих доказа о појави резистенције, узимајући у обзир да санитарни услови и близина нетретираних уточишта могу повећати ризик од поновне инфестације.
- У случајевима када се покаже да се са правилно примењеном дозом не постиже очекивани ниво контроле, треба престати са употребом било ког производа који садржи хемикалију исте класе.
- Корисници треба да обавесте носиоца решења о признавању одобрења ако третмани нису ефикасни.

5.2. Мере за смањење ризика

Уклоните вишак биоцидног производа са површина након третмана.

Не прекорачујте прописане дозе.

Не користите директно на или близу хране, хране за животиње или пића, или на површинама или прибору који би могли да дођу у директан контакт са храном, храном за животиње, пићем и животињама.

Не наносите на кућне љубимце.

Користите само на местима недоступним деци и животињама, посебно мачкама.

Држите децу и кућне љубимце, посебно мачке даље од простора који се третира.

Пре примене уклоните или прекријте тераријуме, акваријуме или кавезе за животиње.

Током прскања искључите филтер за ваздух у акваријуму.

Не перите третиране површине.

Не прскајте уз ветар или током кишних или ветровитих дана.

Заштитите од смрзавања.

5.3. Подаци о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине

Не очекују се директни или индиректни нежељени ефекти када се производ користи у складу са упутством наведеним на етикети.

Пиретроиди могу изазвати парестезију (пецкање и мравињање коже без иритације). Ако симптоми потрају потражите савет лекара.
Ако је потребан медицински савет, имајте код себе амбалажу или етикету производа. Не бацајте празну посуду у животну средину.
Чувајте даље од хране, пића или хране за животиње.
АКО СЕ УДАХНЕ: Ако се појаве симптоми позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА или лекара.
АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати кожу водом. Ако се појаве симптоми, позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА или лекара.
АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Ако се појаве симптоми испрати водом. Уклоните контактна сочива, ако их имате и ако је то могуће лако учинити. Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА или лекара.

5.4. Упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже

Складиштите производ на собној температури, даље од сунчеве светлости.
Не испуштајте неискоришћени производ у земљиште, водотокове, цеви (умиваоник, тоалет...) нити у одводе.
Одложите садржај/амбалажу у складу са локалним прописима.

5.5. Услови складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења

Рок употребе: 4 године.
Чувати на хладном, сувом месту, на температури између 0 °C и 40 °C. Избежавати директну сунчеву светлост и запаљиве материјале.
Складиштити амбалажу у вертикалном и никада у хоризонталном положају.
Чувати затворено у оригиналној амбалажи.
Чувати даље од оксидујућих материјала, киселина и база.
Складиштити затворено на собној температури.
Посуде под притиском могу да експлодирају ако се прегреју и одлете на велику удаљеност.
Чувати ван домашаја деце и кућних љубимаца.

6. Друге информације о биоцидном производу, по потреби

--